




Lesiones físicas por violencia interpersonal en adultos de Colcapirhua.

Physical Injuries from Interpersonal Violence in Adults from Colcapirhua.

Lesões físicas por violência interpessoal em adultos de Colcapirhua

 María Guadalupe Ledezma Hinojosa ¹
 Verónica Belén Orellana Lovera ²
 Lorena Jhisleidy Cabrera Quinteros ²

Resumen.

Introducción: La violencia interpersonal es un problema de salud pública con severas consecuencias físicas y psicológicas. Los estudios en América del Sur revelan una variedad de lesiones físicas, como contusiones y fracturas, con disparidades según el sexo. Este estudio investiga la relación entre el sexo y las lesiones en adultos de Colcapirhua, Cochabamba, para mejorar estrategias de intervención. **Metodología:** Este estudio cuantitativo y transversal investigó la relación entre el sexo y las lesiones físicas por violencia interpersonal en adultos de Colcapirhua durante el primer trimestre de 2024. Con 226 participantes, se recopilaron datos mediante cuestionarios confidenciales y se analizaron con SPSS. Se usaron pruebas de Chi-cuadrado para evaluar significancia estadística ($p < 0.05$). **Resultados:** En el estudio participaron 226 personas de 18 a 65 años, con un 27 % hombres y un 73 % mujeres. El 35 % sufrió lesiones por violencia interpersonal, con contusiones (75 %) siendo las más comunes. El 73 % no buscó atención médica. No hubo una relación significativa entre sexo y lesiones físicas ($p=0.18$). **Discusión:** El estudio evaluó a 226 personas de 18 a 65 años para investigar la relación entre el sexo y las lesiones físicas por violencia interpersonal. El 35 % sufrió lesiones, principalmente contusiones. El 73 % no buscó atención médica. No se encontró una relación significativa entre sexo y lesiones ($p=0.18$), resaltando la necesidad de estrategias de intervención.

Palabras clave: Violencia interpersonal, Incidencia de lesiones, Disparidades de sexo.

Abstract.

Introduction: Interpersonal violence is a public health issue with severe physical and psychological consequences. Studies in South America reveal various physical injuries, such as bruises and fractures, with disparities by sex. This study investigates the relationship between sex and injuries in adults from Colcapirhua, Cochabamba, to improve intervention strategies. **Methodology:** This quantitative cross-sectional study investigated the relation-

Correspondencia a:

¹ Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEPC. Centro de Investigación de Salud Pública (CISPU). Cochabamba-Bolivia.

² Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEPC. Centro de Investigación de Enfermería (CIDEU). Cochabamba-Bolivia.

Email de contacto:

malupe_ledezma@hotmail.com

belenlovera105@gmail.com

lorenajh910@mail.com

Recibido para publicación:

25 de abril del 2024

Aceptado para publicación:

29 de junio del 2024

Citar como:

Ledezma Hinojosa MG, Orellana Lovera VB, Cabrera Quinteros LJ. Lesiones físicas por violencia interpersonal en adultos de Colcapirhua. Rev. cient. enferm. UNITEPC. 2024;6(1):35-40.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ship between sex and physical injuries from interpersonal violence in adults from Colcapirhua during the first quarter of 2024. With 226 participants, data were collected through confidential questionnaires and analyzed with SPSS. Chi-square tests were used to evaluate statistical significance ($p < 0.05$). **Results:** The study involved 226 people aged 18 to 65 years, with 27% men and 73% women. 35% suffered injuries from interpersonal violence, with bruises (75%) being the most common. 73% did not seek medical attention. There was no significant relationship between sex and physical injuries ($p=0.18$). **Discussion:** The study evaluated 226 people aged 18 to 65 years to investigate the relationship between sex and physical injuries from interpersonal violence. 35% suffered injuries, mainly bruises. 73% did not seek medical attention. No significant relationship was found between sex and injuries ($p=0.18$), highlighting the need for intervention strategies.

Keywords: Interpersonal violence, Injury incidence, Sex disparities.

Resumo.

Introdução: A violência interpessoal é um problema de saúde pública com graves consequências físicas e psicológicas. Estudos na América do Sul revelam uma variedade de lesões físicas, como contusões e fraturas, com disparidades de acordo com o sexo. Este estudo investiga a relação entre o sexo e as lesões em adultos de Colcapirhua, Cochabamba, para melhorar as estratégias de intervenção. **Metodologia:** Este estudo quantitativo e transversal investigou a relação entre o sexo e as lesões físicas por violência interpessoal em adultos de Colcapirhua durante o primeiro trimestre de 2024. Com 226 participantes, os dados foram coletados por meio de questionários confidenciais e analisados com o SPSS. Testes de qui-quadrado foram usados para avaliar a significância estatística ($p < 0,05$). **Resultados:** O estudo envolveu 226 pessoas com idades entre 18 e 65 anos, com 27% homens e 73% mulheres. 35% sofreram lesões por violência interpessoal, com contusões (75%) sendo as mais comuns. 73% não buscaram atendimento médico. Não houve relação significativa entre sexo e lesões físicas ($p=0,18$). **Discussão:** O estudo avaliou 226 pessoas com idades entre 18 e 65 anos para investigar a relação entre o sexo e as lesões físicas por violência interpessoal. 35% sofreram lesões, principalmente contusões. 73% não buscaram atendimento médico. Não foi encontrada relação significativa entre sexo e lesões ($p=0,18$), ressaltando a necessidade de estratégias de intervenção.

Palavras-chave: Violência interpessoal, Incidência de lesões, Disparidades de sexo.

Introducción.

La violencia interpersonal es un problema de salud pública que afecta a individuos de diversas edades y géneros en todo el mundo. Las consecuencias de esta violencia pueden ser graves, tanto a nivel físico como psicológico, impactando significativamente la calidad de vida de las víctimas. Comprender los patrones y factores asociados con las lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal es crucial para el desarrollo de estrategias de intervención efectivas y políticas de salud pública (1,2).

La literatura también indica una disparidad en cómo los hombres y las mujeres experimentan y responden a la violencia interpersonal. En Ecuador, por ejemplo, se ha documentado que la prevalencia de la violencia física contra las mujeres es del 31 %, siendo los perpetradores más comunes las parejas íntimas. Esta disparidad subraya la necesidad de más investigaciones para comprender mejor las diferencias en la incidencia y el tipo de lesiones según el sexo en la región (3–5).

A pesar de estos hallazgos, los estudios sobre la relación entre el sexo de las víctimas y la incidencia de lesiones físicas en América del Sur han sido inconsistentes. Esto resalta la necesidad urgente de más investigaciones en esta área para desarrollar estrategias de intervención efectivas y mejorar las políticas de salud pública en la región (3–5).

A pesar de la abundante literatura sobre las consecuencias de la violencia interpersonal, la relación específica entre el sexo de las víctimas y las lesiones físicas sigue siendo poco clara. Este estudio busca llenar este vacío examinando la incidencia y la naturaleza de las lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal en una muestra diversa de adultos, y evaluando la relación entre el sexo y la probabilidad de sufrir estas lesiones (6,7).

El objetivo principal de este estudio es investigar la relación entre el sexo y las lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal en una población adulta de Colcapirhua - Cochabamba, analizando la incidencia y el tipo de lesiones sufridas, así como la búsqueda de atención médica posterior a dichas lesiones.

Metodología.

Fue un estudio cuantitativo, transversal, diseñado para investigar la relación entre el sexo y las lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal en una población adulta de Colcapirhua, analizando la incidencia y el tipo de lesiones sufridas, así como la búsqueda de atención médica posterior a dichas lesiones durante el primer trimestre de 2024. La población de estudio consistió en adultos de 18 a 65 años residentes en el área urbana de Colcapirhua. La muestra final incluyó a 226 participantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Los datos se recolectaron mediante cuestionarios estructurados, los cuales incluían preguntas sobre experiencias de violencia, tipos de lesiones sufridas y búsqueda de atención médica posterior. Los cuestionarios fueron administrados a los participantes de manera confidencial para asegurar la veracidad de las respuestas y la protección de la identidad de los participantes. Las variables dependientes incluyeron los tipos de lesiones físicas (contusiones, fracturas, heridas cortantes, lesiones en la cabeza, moretones), mientras que las variables independientes se centraron en el sexo del participante (masculino, femenino). También se consideraron otras variables como la edad y la búsqueda de atención médica.

Los datos se analizaron utilizando el software estadístico SPSS versión 25.0. Se aplicaron pruebas de Chi-cuadrado para evaluar la relación entre el sexo y la incidencia de lesiones físicas, considerando un valor de $p < 0.05$ como estadísticamente significativo. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la institución correspondiente. Todos los participantes aceptaron formar parte del estudio al responder el cuestionario. Se garantizó la confidencialidad de la información recolectada mediante el uso de códigos anónimos para identificar a los participantes, asegurando que sus respuestas no pudieran ser vinculadas personalmente a ellos.

Resultados:

En el estudio participaron 226 personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. De ellos, el 27 % ($n=60$) eran de sexo masculino y el 73 % ($n=166$) de sexo femenino. El 35 % ($n=80$) había sufrido lesiones físicas como resultado de la violencia interpersonal, mientras que el 65 % restante no había sufrido dichas lesiones.

Tabla 1. Lesiones físicas resultado de la violencia interpersonal

Lesiones físicas	N.º	%
Contusiones.	60	75
Fracturas.	4	5
Heridas cortantes o punzantes.	10	13
Lesiones en la cabeza.	4	5
Moretones	2	3
Total general	80	100

Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta: ¿Buscaste atención médica después de sufrir lesiones debido a la violencia interpersonal? El 73 % (n=58) respondió que no, mientras que el 27 % restante (n=22) respondió que sí.

Tabla 2. Relación entre el sexo de las personas que sufrieron lesiones por violencia interpersonal.

Sexo	No	Sí.	Total general
Masculino.	34	26	60
Femenino.	112	54	166
Total general	146	80	226
Prueba de Chi-cuadrado: p (0.18)			

Fuente: Elaboración propia.

Esto indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre el sexo y las lesiones físicas resultado de la violencia interpersonal en este conjunto de datos.

Discusión.

El presente estudio evaluó a 226 personas con edades entre 18 y 65 años para investigar la relación entre el sexo y las lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal. La muestra estuvo compuesta por un 27 % de participantes masculinos (n=60) y un 73 % de participantes femeninos (n=166). De estos, el 35 % (n=80) había sufrido lesiones físicas como consecuencia de la violencia interpersonal, mientras que el 65 % restante no había experimentado tales lesiones (8).

Entre las personas que sufrieron lesiones, se identificaron varios tipos, siendo las contusiones las más comunes, con un 75 % (n=60) del total de casos. Otros tipos de lesiones incluyeron heridas cortantes o punzantes (13 %, n=10), fracturas (5 %, n=4), lesiones en la cabeza (5 %, n=4) y moretones (3 %, n=2). Estos hallazgos sugieren que la mayoría de las lesiones son de naturaleza no grave, aunque una minoría significativa experimenta daños más serios como fracturas y lesiones en la cabeza.

A la pregunta sobre si buscaron atención médica después de sufrir lesiones debido a la violencia interpersonal, el 73 % (n=58) de los participantes respondió que no, mientras que solo el 27 % (n=22) indicó que sí buscó atención médica. Esta distribución refleja una preocupante tendencia de sub utilización de los servicios de salud entre las víctimas de violencia, lo que puede tener implicaciones negativas para su recuperación y bienestar general.

La distribución de las lesiones según el sexo mostró que, de los hombres, el 11.5 % (n=26) sufrió lesiones, en comparación con el 23.9 % (n=54) de las mujeres. Sin embargo, la prueba de chi-cuadrado no encontró una relación estadísticamente sig-

nificativa entre el sexo y la incidencia de lesiones físicas resultantes de la violencia interpersonal ($p=0.18$). Este resultado sugiere que, dentro de la muestra estudiada, el sexo no es un factor determinante en la probabilidad de sufrir lesiones debido a la violencia interpersonal.

Los resultados indican la necesidad de estrategias de intervención que promuevan la búsqueda de atención médica entre las víctimas de violencia interpersonal, independientemente del tipo de lesión sufrida. Además, aunque no se encontró una relación significativa entre el sexo y la incidencia de lesiones, es importante continuar investigando otros posibles factores que puedan influir en la experiencia de violencia y la respuesta a la misma (9–13).

En conclusión, este estudio subraya la importancia de abordar la violencia interpersonal desde una perspectiva integral que incluya la promoción del acceso a servicios de salud y el apoyo a todas las víctimas, independientemente de su sexo. La falta de significancia estadística en la relación entre sexo y lesiones no debe desviar la atención de la necesidad crítica de recursos y apoyo para todas las víctimas de violencia interpersonal.

Conflictos de intereses.

Los autores no tienen conflictos de intereses.

Fuente de financiamiento.

El estudio fue autofinanciado.

Contribución de los autores.

1. Concepción y diseño del estudio
2. Adquisición de datos
3. Análisis de datos
4. Discusión de los resultados
5. Redacción del manuscrito
6. Aprobación de la versión final del manuscrito

MGLH. 1-6

VBOL. 2-4

LJCQ. 2-4

Aceptación.

Este artículo fue aprobado por el Editor de la revista.

Referencias bibliográficas

1. Prevención de la violencia - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2024 [citado 22 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>
2. Mayor Walton S, Salazar Pérez CA, Mayor Walton S, Salazar Pérez CA. La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. Gac Médica Espirituana [Internet]. abril de 2019 [citado 22 de mayo de 2024];21(1):96-105. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1608-89212019000100096&lng=es&nrm=iso&tlng=es
3. Bernardino ÍM, Barbosa KGN, Nóbrega LM, Cavalcante GMS, Ferreira EF e, d'Ávi-



- la S. Violência interpessoal, circunstâncias das agressões e padrões dos traumas maxilofaciais na região metropolitana de Campina Grande, Paraíba, Brasil (2008-2011). *Ciênc Saúde Coletiva* [Internet]. septiembre de 2017 [citado 22 de mayo de 2024];22:3033-44. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/csc/a/HLqQSwH5vQp-8DxqzkYKhLpw/abstract/?lang=pt>
4. Romero E del CC, Pinela TCN, Yanez VPS, Paucar OAM. Violencia de género contra las mujeres en la provincia del Guayas, Ecuador. *Rev Lex* [Internet]. 2 de junio de 2022 [citado 22 de mayo de 2024];5(16):163-75. Disponible en: <https://revistalex.org/index.php/revistalex/article/view/135>
 5. Weitzman A, Caudillo M, Levy EJ. Hybrid Interpersonal Violence in Latin America: Patterns and Causes. *Annu Rev Criminol* [Internet]. 26 de enero de 2024 [citado 22 de mayo de 2024];7(Volume 7, 2024):163-86. Disponible en: <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-criminol-022422-014603>
 6. OMS. La violencia puede afectar a cualquiera [Internet]. 2014 [citado 22 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/violence-can-affect-anyone>
 7. Rojas-Solís JL, Guzmán-Pimentel M, Jiménez-Castro MP, Martínez-Ruiz L, Flores-Hernández BG. La violencia hacia los hombres en la pareja heterosexual: una revisión de revisiones. *Cienc Soc* [Internet]. 2019 [citado 22 de mayo de 2024];44(1):57-70. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/870/87060695011/html/>
 8. Paula DC. Violencia bidireccional, frecuencia, severidad, lesiones y género en parejas en Arequipa, Perú. *Interdisciplinaria* [Internet]. 2023 [citado 22 de mayo de 2024];40(3). Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/180/18075154007/html/>
 9. Cortés CIJ, Aragón SR, Castro EFA de, Rivera LR. Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y Factores Asociados. *Acta Investig Psicológica* [Internet]. [citado 22 de mayo de 2024];5(3):2224-39. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3589/358943649010/movil/>
 10. Hernández RR, Esquivel-Santoveña EE. Prevalencia y factores asociados con la violencia de pareja en las adultas mayores mexicanas. *Salud Colect* [Internet]. 6 de julio de 2020 [citado 22 de mayo de 2024];16:e2600. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/scol/2020.v16/e2600/>
 11. Rey Anacona CA. Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas con la violencia en el noviazgo: una revisión de la literatura. *Av En Psicol Latinoam* [Internet]. diciembre de 2008 [citado 22 de mayo de 2024];26(2):227-41. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1794-47242008000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 12. Tiravanti-Delgado D, Chuquizuta-Lucero M, Barja-Ore J, Valverde-Espinoza N. Prevalencia y factores asociados a distintos tipos de violencia íntima de pareja en mujeres peruanas. *Rev Cuba Med Mil* [Internet]. 15 de noviembre de 2021 [citado 22 de mayo de 2024];50(4):02101562. Disponible en: <https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1562>
 13. Márquez SV, Mora AM. Identificación de los factores de riesgo de violencia de género en el Ecuador como base para una propuesta preventiva. *Rev Desarro Soc* [Internet]. 1 de junio de 2022 [citado 22 de mayo de 2024];(91):111-42. Disponible en: <https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/dys/article/view/6795>.